

Приемлемость применения самостоятельно взятых мазков для цервикального скрининга среди недостаточно обследованного коренного населения

Актуальность Вирус папилломы человека (ВПЧ), вызывающий рак шейки матки, можно обнаружить при скрининге с использованием самостоятельно взятых мазков (самообследование). Данный метод преодолевает барьеры для проведения обследования среди женщин-маори, которые страдают от заболеваний шейки матки в большей степени, чем новозеландские женщины европеоидной расы.

Цели Цель данного исследования — изучить потенциальную приемлемость самотестирования на ВПЧ среди женщин-маори, ранее не проходивших скрининг или проходивших его нерегулярно (не проходила обследование шейки матки в течение 4+ лет; возраст 25 лет и старше), на основе принципов Каурара Мāori с использованием смешанных методов, включающих фокус-группы/интервью и опрос.

Материалы и методы Исследователи из сообщества маори проводили тестирование женщин из четырех регионов (N = 106) и помогали опросить участниц-респондентов (N = 397). Также проводился опрос медицинских работников (N = 17). Полученные в результате работы с фокус-группами данные были подвергнуты тематическому анализу. Результаты опросов были проанализированы по возрастным группам, группам из сельской/городской местности, по регистрации в организациях первичной медико-санитарной помощи и по времени с момента последнего обследования шейки матки.

Результаты Большинство участников опроса были зарегистрированы в организациях первичной медико-санитарной помощи (87,15%) и регулярно посещали их (71,79%), но не проходили регулярный скрининг на заболевания шейки матки. Стремление к телесной автономии, в том числе «whakamā» (смушение/застенчивость/сдержанность), оказалось наиболее часто упоминаемым препятствием для прохождения скрининга. Три из четырех женщин сообщали, что вероятно/очень вероятно могут провести самотестирование на ВПЧ. Девять из десяти женщин сообщали, что вероятно/очень вероятно будут наблюдаться у врача, если тест на ВПЧ окажется положительным. Женщины и работники здравоохранения в фокус-группах подчеркивали значение медицинской грамотности, культурной компетентности и эмпатической поддержки.

Заключение Полученные данные указывают на то, что при оправданных с культурологической точки зрения формах внедрения самотестирования, многие женщины, которые в настоящее время не проходят скрининг или проходят его нерегулярно, будут готовы пройти обследование и, в случае необходимости, наблюдаться у врача. Благодаря внедрению методов самотестирования на ВПЧ, могут быть спасены жизни многих женщин.